

「藥品給付規定」修正規定

第 2 節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自 104 年 8 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>2.8.2. 肺動脈高血壓治療劑 (95/1/1、97/6/1、98/12/1、99/11/1、100/4/1、103/7/1、104/6/1、<u>104/8/1</u>)：</p> <p>此類藥物原則上不得併用，惟符合下列之一情況者，得經事前審查核准通過接受合併治療：</p> <p>1. WHO Functional Class III 及 IV 嚴重且危及生命之原發性肺動脈高血壓患者，使用單一藥物治療成效不佳時。</p> <p>2. <u>WHO Functional Class III 之先天性心臟病續發肺動脈高血壓患者，使用單一藥物治療三個月後成效不佳時。(104/8/1)</u></p> <p>2.8.2.1. Iloprost (如 Ventavis、Ilomedin-20)：(略)</p> <p>2.8.2.2. Sildenafil (如 Revatio)：(略)</p> <p>2.8.2.3. Ambrisentan (如 Volibris)；macitentan (如 Opsumit) (98/12/1、103/7/1、<u>104/8/1</u>)：</p> <p>1. 限用於原發性肺動脈高血壓之</p>	<p>2.8.2. 肺動脈高血壓治療劑 (95/1/1、97/6/1、98/12/1、99/11/1、100/4/1、103/7/1、104/6/1)：</p> <p>此類藥物原則上不得併用，惟 WHO Functional Class III 及 IV 嚴重且危及生命之原發性肺動脈高血壓患者，使用單一藥物治療成效不佳時，得經事前審查核准通過接受合併治療。</p> <p>2.8.2.1. Iloprost (如 Ventavis、Ilomedin-20)：(略)</p> <p>2.8.2.2. Sildenafil (如 Revatio)：(略)</p> <p>2.8.2.3. <u>Bosentan</u>(如 Tracleer)；<u>ambrisentan</u> (如 Volibris)；<u>macitentan</u> (如 Opsumit) (98/12/1、103/7/1)：</p> <p>1. 限用於原發性肺動脈高血壓之</p>

<p>治療。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次限用 1 粒。</p> <p>2.8.2.4. Riociguat (如 Adempas) (104/6/1) :</p> <p>1. 限用於</p> <p>(1) 原發性肺動脈高血壓之治療。</p> <p>(2) 無法手術或術後仍持續發生或復發、肺功能分級為 WHO 第 II 級到第 III 級的慢性血栓性肺高壓 (CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hypertension) 之成年患者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次限用 1 粒。</p> <p><u>2.8.2.5. Bosentan (如 Tracleer) (98/12/1、103/7/1、104/8/1) :</u></p> <p><u>1. 用於原發性肺動脈高血壓。</u></p> <p><u>2. 用於因先天性心臟病續發 WHO Functional Class III 肺動脈高血壓(伴隨先天性 Systemic-to-pulmonary shunts 與 Eisenmenger physiology)。</u></p> <p><u>3. 需經事前審查核准後使用。</u></p> <p><u>4. 每次限用 1 粒。</u></p>	<p>治療。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次限用 1 粒。</p> <p>2.8.2.4. Riociguat (如 Adempas) (104/6/1) :</p> <p>1. 限用於</p> <p>(1) 原發性肺動脈高血壓之治療。</p> <p>(2) 無法手術或術後仍持續發生或復發、肺功能分級為 WHO 第 II 級到第 III 級的慢性血栓性肺高壓 (CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hypertension) 之成年患者。</p> <p>2. 需經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 每次限用 1 粒。</p>
--	---

備註：劃線部分為新修訂規定