

「藥品給付規定」修正規定

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自104年11月1日生效)

修正後給付規定	原給付規定																																																																																								
<p>2.1.2.2.r-TPA (如 Actilyse Inj) 用於急性缺血性腦中風時：</p> <p>附表二-C 急性缺血性腦中風之血栓溶解治療檢查表</p> <p>一、 收案條件 (必須均為”是”)</p> <table border="0"> <tr> <td>是</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>臨床懷疑是急性缺血性腦中風，中風時間明確在3小時內並已完成各項檢查。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>腦部電腦斷層沒有顱內出血。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>年齡在18歲到80歲之間。</td> </tr> </table> <p>二、 排除條件 (必須均為”否”)</p> <table border="0"> <tr> <td>是</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>輸注本藥前，缺血性發作的時間已超過3小時或症狀發作時間不明。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>輸注本藥前，急性缺血性腦中風的症狀已迅速改善或症狀輕微。(例如 NIHSS&lt;4分) (104/11/1)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>臨床 (例如 NIHSS&gt;25分) 及/或適當之影像術評估為嚴重之中風 (電腦斷層大於1/3中大腦動脈灌流區之低密度變化)。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>中風發作時併發癲癇。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>最近3個月內有中風病史或有嚴重性頭部創傷。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>過去曾中風且合併糖尿病。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>中風發作前48小時內使用 heparin，目前病人活化部分凝血酶原時間(aPTT)之值過高。</td> </tr> </table>	是	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		臨床懷疑是急性缺血性腦中風，中風時間明確在3小時內並已完成各項檢查。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		腦部電腦斷層沒有顱內出血。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		年齡在18歲到80歲之間。	是	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		輸注本藥前，缺血性發作的時間已超過3小時或症狀發作時間不明。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		輸注本藥前，急性缺血性腦中風的症狀已迅速改善或症狀輕微。(例如 NIHSS<4分) (104/11/1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		臨床 (例如 NIHSS>25分) 及/或適當之影像術評估為嚴重之中風 (電腦斷層大於1/3中大腦動脈灌流區之低密度變化)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		中風發作時併發癲癇。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		最近3個月內有中風病史或有嚴重性頭部創傷。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		過去曾中風且合併糖尿病。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		中風發作前48小時內使用 heparin，目前病人活化部分凝血酶原時間(aPTT)之值過高。	<p>2.1.2.2.r-TPA (如 Actilyse Inj) 用於急性缺血性腦中風時：</p> <p>附表二-C 急性缺血性腦中風之血栓溶解治療檢查表</p> <p>一、 收案條件 (必須均為”是”)</p> <table border="0"> <tr> <td>是</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>臨床懷疑是急性缺血性腦中風，中風時間明確在3小時內並已完成各項檢查。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>腦部電腦斷層沒有顱內出血。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>年齡在18歲到80歲之間。</td> </tr> </table> <p>二、 排除條件 (必須均為”否”)</p> <table border="0"> <tr> <td>是</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>輸注本藥前，缺血性發作的時間已超過3小時或症狀發作時間不明。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>輸注本藥前，急性缺血性腦中風的症狀已迅速改善或症狀輕微。(例如 NIHSS&lt;6分)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>臨床 (例如 NIHSS&gt;25分) 及/或適當之影像術評估為嚴重之中風 (電腦斷層大於1/3中大腦動脈灌流區之低密度變化)。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>中風發作時併發癲癇。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>最近3個月內有中風病史或有嚴重性頭部創傷。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>過去曾中風且合併糖尿病。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>中風發作前48小時內使用 heparin，目前病人活化部分凝血酶原時間(aPTT)之值過高。</td> </tr> </table>	是	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		臨床懷疑是急性缺血性腦中風，中風時間明確在3小時內並已完成各項檢查。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		腦部電腦斷層沒有顱內出血。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		年齡在18歲到80歲之間。	是	否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		輸注本藥前，缺血性發作的時間已超過3小時或症狀發作時間不明。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		輸注本藥前，急性缺血性腦中風的症狀已迅速改善或症狀輕微。(例如 NIHSS<6分)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		臨床 (例如 NIHSS>25分) 及/或適當之影像術評估為嚴重之中風 (電腦斷層大於1/3中大腦動脈灌流區之低密度變化)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		中風發作時併發癲癇。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		最近3個月內有中風病史或有嚴重性頭部創傷。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		過去曾中風且合併糖尿病。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		中風發作前48小時內使用 heparin，目前病人活化部分凝血酶原時間(aPTT)之值過高。
是	否																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	臨床懷疑是急性缺血性腦中風，中風時間明確在3小時內並已完成各項檢查。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	腦部電腦斷層沒有顱內出血。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	年齡在18歲到80歲之間。																																																																																								
是	否																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	輸注本藥前，缺血性發作的時間已超過3小時或症狀發作時間不明。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	輸注本藥前，急性缺血性腦中風的症狀已迅速改善或症狀輕微。(例如 NIHSS<4分) (104/11/1)																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	臨床 (例如 NIHSS>25分) 及/或適當之影像術評估為嚴重之中風 (電腦斷層大於1/3中大腦動脈灌流區之低密度變化)。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	中風發作時併發癲癇。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	最近3個月內有中風病史或有嚴重性頭部創傷。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	過去曾中風且合併糖尿病。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	中風發作前48小時內使用 heparin，目前病人活化部分凝血酶原時間(aPTT)之值過高。																																																																																								
是	否																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	臨床懷疑是急性缺血性腦中風，中風時間明確在3小時內並已完成各項檢查。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	腦部電腦斷層沒有顱內出血。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	年齡在18歲到80歲之間。																																																																																								
是	否																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	輸注本藥前，缺血性發作的時間已超過3小時或症狀發作時間不明。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	輸注本藥前，急性缺血性腦中風的症狀已迅速改善或症狀輕微。(例如 NIHSS<6分)																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	臨床 (例如 NIHSS>25分) 及/或適當之影像術評估為嚴重之中風 (電腦斷層大於1/3中大腦動脈灌流區之低密度變化)。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	中風發作時併發癲癇。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	最近3個月內有中風病史或有嚴重性頭部創傷。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	過去曾中風且合併糖尿病。																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																								
	中風發作前48小時內使用 heparin，目前病人活化部分凝血酶原時間(aPTT)之值過高。																																																																																								

- 血小板 $<100,000/\text{mm}^3$ 。
- 活動性內出血。
- 顱內腫瘤、動靜脈畸形或血管瘤。
- 收縮壓 $>185\text{mmHg}$  或舒張壓 $>110\text{mmHg}$ ，或需要積極的治療（靜脈給藥）以降低血壓至前述界限以下。
- 血糖 $<50\text{mg/dL}$  或 $>400\text{mg/dL}$ 。
- 目前或過去6個月內有顯著的出血障礙、易出血體質。
- 病人正接受口服抗凝血劑，如 warfarin sodium (INR $>1.3$ )。
- 中樞神經系統損害之病史（腫瘤、血管瘤、顱內或脊柱的手術）。
- 懷疑或證實包括蜘蛛膜下腔出血之顱內出血或其病史。
- 嚴重且未被控制的動脈高血壓。
- 過去10天內曾動過大手術或嚴重創傷（包括最近之急性心肌梗塞所伴隨的任何創傷）、最近頭部或顱部曾發生創傷。
- 過久的或創傷性的心肺復甦術（超過2分鐘）、分娩、過去10天內曾對無法壓制之部位施行血管穿刺（如鎖骨下靜脈或頸靜脈穿刺）。
- 嚴重肝病，包括肝衰竭、肝硬化、肝門脈高壓（食道靜脈曲張）及急性肝炎。
- 出血性視網膜病變，如糖尿病性（視覺障礙可能為出血性視網膜病變的指標）或其他出血性眼疾。
- 細菌性心內膜炎，心包炎。
- 急性胰臟炎。
- 最近3個月內曾患胃腸道潰瘍。
- 動脈瘤，靜/動脈畸形。
- 易出血之腫瘤。
- 對本藥之主成分或賦型劑過敏者。
- 其他（例如在排除條件未提到但會增加出血危險狀況，如洗腎患者、

- 血小板 $<100,000/\text{mm}^3$ 。
- 活動性內出血。
- 顱內腫瘤、動靜脈畸形或血管瘤。
- 收縮壓 $>185\text{mmHg}$  或舒張壓 $>110\text{mmHg}$ ，或需要積極的治療（靜脈給藥）以降低血壓至前述界限以下。
- 血糖 $<50\text{mg/dL}$  或 $>400\text{mg/dL}$ 。
- 目前或過去6個月內有顯著的出血障礙、易出血體質。
- 病人正接受口服抗凝血劑，如 warfarin sodium (INR $>1.3$ )。
- 中樞神經系統損害之病史（腫瘤、血管瘤、顱內或脊柱的手術）。
- 懷疑或證實包括蜘蛛膜下腔出血之顱內出血或其病史。
- 嚴重且未被控制的動脈高血壓。
- 過去10天內曾動過大手術或嚴重創傷（包括最近之急性心肌梗塞所伴隨的任何創傷）、最近頭部或顱部曾發生創傷。
- 過久的或創傷性的心肺復甦術（超過2分鐘）、分娩、過去10天內曾對無法壓制之部位施行血管穿刺（如鎖骨下靜脈或頸靜脈穿刺）。
- 嚴重肝病，包括肝衰竭、肝硬化、肝門脈高壓（食道靜脈曲張）及急性肝炎。
- 出血性視網膜病變，如糖尿病性（視覺障礙可能為出血性視網膜病變的指標）或其他出血性眼疾。
- 細菌性心內膜炎，心包炎。
- 急性胰臟炎。
- 最近3個月內曾患胃腸道潰瘍。
- 動脈瘤，靜/動脈畸形。
- 易出血之腫瘤。
- 對本藥之主成分或賦型劑過敏者。
- 其他（例如在排除條件未提到但會增加出血危險狀況，如洗腎患者、

嚴重心衰竭或身體太衰弱者)。

嚴重心衰竭或身體太衰弱者)。

備註：劃線部分為新修訂之規定。