

「藥品給付規定」修正規定

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自104年12月1日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors) (101/6/1、<u>104/12/1</u>)</p> <p>2.1.5.1. Dabigatran <u>110mg 及150mg</u> (如 Pradaxa <u>110mg 及150mg</u>) (<u>101/6/1、104/12/1</u>)</p> <p>1. 限用於非瓣膜性心房纖維顫動病患，且須符合下列條件之一：</p> <ul style="list-style-type: none">(1)曾發生中風或全身性栓塞。(2)左心室射出分率小於40%。(3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。(4)年齡75歲(含)以上。(5)年齡介於65歲至74歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。 <p>2. 排除標準：</p> <ul style="list-style-type: none">(1)病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。(2)14天內發生中風。(3)收案前的6個月內發生嚴重中風。(4)有增加出血風險的情況。(5)肌酸酐清除率小於 30 mL/min。(6)活動性肝病和懷孕。 <p>2.1.5.2. Dabigatran 75mg (如</p>	<p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors) (101/6/1)</p> <p>2.1.5.1. Dabigatran (如 Pradaxa)</p> <p>1. 限用於非瓣膜性心房纖維顫動病患，且須符合下列條件之一：</p> <ul style="list-style-type: none">(1)曾發生中風或全身性栓塞。(2)左心室射出分率小於40%。(3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。(4)年齡75歲(含)以上。(5)年齡介於65歲至74歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。 <p>2. 排除標準：</p> <ul style="list-style-type: none">(1)病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。(2)14天內發生中風。(3)收案前的6個月內發生嚴重中風。(4)有增加出血風險的情況。(5)肌酸酐清除率小於 30 mL/min。(6)活動性肝病和懷孕。

Pradaxa 75mg) (104/12/1)

1. 限用於靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髌或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)，限用75mg，每日至多二粒，人工髌關節手術術後治療，最多5週；人工膝關節手術術後治療，最多2週：

(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患。

(2)經靜脈超音波檢查（Venous ultrasonography）、靜脈攝影（Venography）或血中D-dimer檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。

2. 排除標準：

(1)病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。

(2)14天內發生中風。

(3)收案前的6個月內發生嚴重中風。

(4)有增加出血風險的情況。

(5)肌酸酐清除率小於 30 mL/min。

(6)活動性肝病和懷孕。

備註：劃線部份為新修正之規定