


「全民健康保險藥品已收載品項異動明細表」

| 項次 | 健保代碼 | 藥品名稱 | 成分及含量 | 規格量 | 藥商名稱 | 原支付價 | 初核價格 | 異動說明 | 生效日期 |
|----|------------|----------------------------------|------------------|-----|------|------|------|---|-----------|
| 1 | B025129100 | XARELTO FILM-COATED TABLETS 10MG | rivaroxaban 10mg | | 拜耳 | 98 | 82 | 1.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第7次(103年2月)會議結論辦理。 2.本案藥品依價量協議結果,支付價調整為82元。 3.給付規定:適用通則及2.1.4.2.規定。 | 103/05/01 |
| 2 | B025648100 | XARELTO FILM-COATED TABLETS 15MG | rivaroxaban 15mg | | 拜耳 | 98 | 82 | 1.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第7次(103年2月)會議結論辦理。 2.本案藥品依價量協議結果,支付價調整為82元。 3.給付規定:適用通則及2.1.4.2.規定。 | 103/05/01 |
| 3 | B025647100 | XARELTO FILM-COATED TABLETS 20MG | rivaroxaban 20mg | | 拜耳 | 98 | 82 | 1.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第7次(103年2月)會議結論辦理。 2.本案藥品依價量協議結果,支付價調整為82元。 3.給付規定:適用通則及2.1.4.2.規定。 | 103/05/01 |



全民健康保險藥物給付項目及支付標準-第六編第八十三條

「藥品給付規定」修正規定

第 2 章 心臟血管及腎臟藥物

(自 103 年 5 月 1 日生效)

| 修正後給付規定 | 原給付規定 |
|---|---|
| <p>2.1.4.2.Rivaroxaban (如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1、<u>103/5/1</u>)</p> <p>限用於</p> <p>1. 靜脈血栓高危險(符合下列條件之一)病患,接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時,預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE),限用 10 mg 錠劑,每日一粒,人工髖關節手術術後治療,最多 5 週;人工膝關節手術術後治療,最多 2 週:</p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史(須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程)之病患;</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查(Venous ultrasonography)、靜脈攝影(Venography)或血中 D-dimer 檢測,診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2. 非瓣膜性心房纖維顫動病患,須符合下列條件之一:(102/2/1、<u>103/5/1</u>)</p> <p>(1)曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2)左心室射出分率小於 40%。</p> <p>(3)有症狀之心臟衰竭:收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4)年齡 75 歲(含)以上。</p> <p>(5)年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> | <p>2.1.4.2.Rivaroxaban (如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1)</p> <p>限用於</p> <p>1. 靜脈血栓高危險(符合下列條件之一)病患,接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時,預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE),限用 10 mg 錠劑,每日一粒,人工髖關節手術術後治療,最多 5 週;人工膝關節手術術後治療,最多 2 週:(102/2/1)</p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史(須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程)之病患;</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查(Venous ultrasonography)、靜脈攝影(Venography)或血中 D-dimer 檢測,診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2. 非瓣膜性心房纖維顫動病患,限用 15 mg 及 20mg 錠劑且須符合下列條件之一:(102/2/1)</p> <p>(1)曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2)左心室射出分率小於 40%。</p> <p>(3)有症狀之心臟衰竭:收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4)年齡 75 歲(含)以上。</p> <p>(5)年齡介於 65 歲至 74 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</p> |

(6)每日1次,每次限1顆。(103/5/1)

(7)排除標準:

- I 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。
- II 14 天內發生中風。
- III 收案前的6個月內發生嚴重中風。
- IV 有增加出血風險的情況。
- V 肌酸酐清除率小 30 mL/min。
- VI 活動性肝病和懷孕。

3. 急性有症狀近端深部靜脈血栓症

(DVT) 及預防急性深部靜脈血栓
發生後再發靜脈血栓:(103/5/1)

(1)須經血管超音波檢查診斷。

(2)第1日至21日限用15mg錠劑，
每日早晚各一粒。

(3)第22日起限用15mg或20mg錠
劑，每日一粒，最多使用6個月。

(6)排除標準:

- I 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。
- II 14 天內發生中風。
- III 收案前的6個月內發生嚴重中風。
- IV 有增加出血風險的情況。
- V 肌酸酐清除率小 30 mL/min。
- VI 活動性肝病和懷孕。

備註：劃線部份為新修訂之規定。